

# Culture programmée

## Séries Samourai et Youko



Chusan violet



Chusan blanc



Youko® ambre



Youko® citrine



Youko® nacre




Youko® quartz



Jacana



Schang



Youko® agate



Zuki

### Conseils

Toutes ces variétés s'éboutonnent afin d'obtenir une fleur d'un grand diamètre. Sur les variétés : Jacana et Mandalys, il est possible de supprimer le bouton terminal afin d'obtenir une floraison dite en spray, qui donne un type de floraison plus compact du plus bel effet, très commercial.

BOUTURES RACINEES	CULTURE PINCEE				CULTURE UNIFLEUR			Temps de réaction (semaines)
	Je plante	Je pince	J'occulte	Je nanifie	Je plante	J'occulte	Je nanifie	
Chusan violet, blanc	S25 ou 26	S27 ou 28	5 jours	XX	S27 S28 S29	5 à 8 jours 5 à 8 jours 5 à 8 jours	XX XX XX	10,5
Youko® ambre, citrine	S26 ou 27	S28 ou 29	0 à 3 jours	XX	S28 S29	0 à 3 jours	XX	10,5
Youko® quartz	S26 ou 27	S28 ou 29	3 à 4 jours	XX	S28 S29	3 à 4 jours	XX	10,5
Youko® nacre	S26 ou 27	S28 ou 29	3 à 4 jours	XXX	-	-	-	10,5
Youko® agate	S26 ou 27	S28 ou 29	3 à 4 jours	XX	S28 S29	3 à 4 jours	XX	10,5
Jacana	S26 ou 27	S28 ou 29	3 à 4 jours	XX	S28	8 jours	X	10,5
Schang	-	-	-	-	S28 S29	- 3 à 4 jours	XXX XXX	10
Zuki	-	-	-	-	S28 S29	- 3 à 4 jours	XXX XXX	10

S : semaine  
X : Passage de nanifiant

\* Pour la culture pincée : occulter 8 à 10 jours après le pincement  
Pour la culture unifleur : occulter après la reprise de la bouture soit 8 à 10 jours après la plantation.  
Pour Youco nacre : nanifier peu de temps après le pincement

Tableaux de plantation théoriques, tenir compte des conditions culturales et de la région.